

Therapiehinweise zur Scabiesbehandlung

Sie haben **INFECTOS CAB 5% Creme** bzw. eine Rezeptur mit dem Wirkstoff Permethrin zur Therapie der Scabies verschrieben bekommen. Damit Sie die Krankheit erfolgreich behandeln, beachten Sie bitte die Empfehlungen Ihres Arztes. Zusätzlich sind nachfolgend einige allgemeine Informationen zur Therapie der Scabies (Krätze) aufgeführt.

Therapiehinweise

- ☑ Tragen Sie die Creme abends auf den gesamten Körper vom Hals abwärts auf. Am nächsten Morgen können Sie sie abbaden oder abduschen.
- ☑ In der Regel genügt eine einmalige Anwendung.
- ☑ Nach der Therapie sollten hautpflegende Maßnahmen durchgeführt werden.
- ☑ Der Juckreiz dauert in der Regel einige Tage an, auch wenn durch erfolgreiche Therapie die Ursache beseitigt ist. Zur Linderung können juckreizstillende Präparate verordnet werden.
- ☑ Nach zwei Wochen sollte eine Kontrolluntersuchung erfolgen.

Besonderheiten

- ☑ Behandeln Sie bei Säuglingen und Kleinkindern auch den Kopf unter Aussparung des Mund- und Augenbereichs mit.
- ☑ Wenn Sie innerhalb von 8 Stunden nach der Anwendung einen bereits behandelten Hautbereich waschen, sollten Sie die Creme erneut auf diese Bereiche auftragen.
- ☑ Beim Auftragen sollten die Bereiche zwischen den Fingern und Zehen (auch unter Zehen- und Fingernägeln), die Handgelenke, Ellenbeugen, Achselhöhlen, äußere Genitale und Gesäß besonders sorgfältig behandelt werden.

Zusätzliche Maßnahmen

- ☑ Fingernägel sollten Sie kurz halten und sorgfältig reinigen, da sie den Erregern ein Versteck bieten und bei starkem Juckreiz zu Verletzungen führen können.
- ☑ Wechseln Sie Bett- und Körperwäsche nach der Therapie und waschen Sie diese bei mindestens 60 °C.
- ☑ Teppiche und Polster sollten intensiv gesaugt werden. Bei starkem, hartnäckigem Befall kann die Anwendung eines Insektizids durch einen Fachmann sinnvoll sein.
- ☑ Nicht waschbare Gegenstände können durch Nichtbenutzen und Lüften für eine Woche entwest werden.

Datum, Unterschrift

Arztstempel